

# Imunisasi

Imunisasi adalah Suatu usaha untuk memberikan kekebalan kepada bayi dan anak terhadap penyakit tertentu.

## TUJUAN IMUNISASI

1. Mencegah penyakit tertentu.
2. Apabila terjadi penyakit tidak akan terlalu parah dan dapat mencegah terjadinya gejala yang dapat menimbulkan kecacatan / kematian.

## Waktu pemberian imunisasi

Imunisasi diberikan sejak umur 0 – 12 bulan dan seharusnya bayi mendapat imunisasi pada:

1. Umur 0 - 1 bulan :BCG, Polio, Hepatitis B1
2. Umur 2 Bulan :DPT 1, Polio 2, Hepatitis B2
3. Umur 3 bulan : DPT 2, dan polio 3
4. Umur 4 Bulan : DPT 3, Hepatitis 3 dan polio 4
5. Umur 9 Bulan : Campak,

## MACAM-MACAM VAKSIN

### Vaksin BCG

*Tujuannya* : untuk memberikan kekebalan aktif kepada bayi dan anak terhadap penyakit TBC

*Tempat penyuntikan* : 1/3 Bagian lengan kanan atas.

*Akibat bila tidak diberikan* : Bisa tertular TBC berat, TBC tulang, TBC selaput otak.

*Reaksi Penyuntikan:* Secara normal akan timbul pembengkakan kecil, merah pada tempat penyuntikan, kemudian akan menjadi bisul kecil dengan garis tengah 10 mm, dan akan sembuh sendiri.



**Vaksin DPT**




*Tujuannya* : Untuk memberikan kekebalan aktif yang bersamaan terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus.

*Tempat penyuntikan* : Didaerah otot paha atau dibawah kulit.

Reaksi akibat bila tidak diberikan : Mudah terkena penyakit difteri, pertusis, tetanus.

*Reaksi penyuntikan* : Demam sampai kejang, pembengkakan dan rasa nyeri pada tempat penyuntikan selama 1 – 2 hari

### Vaksin polio




*Tujuannya* : Untuk memberikan kekebalan kepada anak dan balita terhadap penyakit poliomeilitis atau kelumpuhan.

*Cara pemberian* : Diteteskan lewat mulut atau suntikan

*Akibat bila tidak diberikan* : Mudah terkena kelumpuhan.

*Reaksi pemberian obat* : Berak berak ringan.



### **Vaksin Hepatitis B**

*Tujuannya* : Memberikan kekebalan terhadap penyakit Hepatitis B atau penyakit kuning.

*Cara pemberian* : Dengan cara penyuntikan didaerah paha.

*Akibat bila tidak diberikan* : Mudah terkena penyakit hepatitis B

Reaksi pemberian : Demam

### **Vaksin campak**

Tujuannya : memberikan kekebalan terhadap penyakit campak.

Cara pemberian : dengan suntikan

*Akibat bila tidak diberikan* : mudah terkena penyakit campak

Reaksi pemberian : demam ringan, bercak merah pada wajah

### **Hal hal yang diperhatikan**

1. Imunisasi diberikan pada bayi / anak yang sehat
2. Pada anak yang sakit tidak boleh diberikan seperti :
  - a. Sakit keras
  - b. Dalam masa tunas suatu penyakit.

c. Penurunan daya tahan tubuh (Defisiensi imunologis).

- Bila reaksi imunisasi berlanjut , hubungi petugas kesehatan terdekat.

# IMUNISASI

**PROGRAM PROFESI KEPERAWATAN  
KOMUNITAS (PPKK)  
PROGRAM STUDI S I KEPERAWATAN  
STIKES TANA TORAJA**